

# 宜蘭縣政府衛生局 105 年新進公共衛生護理人員甄試試題

(選擇題 50 題，每題 2 分)

1. 新近研究顯示，由於人類年齡的延長趨勢，成年晚期的階段有必要加以細分。依據 Hartford 的觀點，老年階段可區分為青老年、中老年、老老年；其中，中老年的年齡範圍為下列何者？  
(A)65~74歲 (B)75~84歲 (C)85~90歲 (D)90歲以上
2. 有關安寧照護服務 (hospice) 之敘述，下列何者正確？  
(A)兼顧臨終病人與其家屬之服務 (B)服務對象均為老年病人  
(C)全部都在醫院的安寧病房實施 (D)主要之理念為儘可能延長生命
3. 下列何種情況，產婦仍適合親自哺餵母乳？  
(A)母親接受化學治療 (B)嬰兒患有先天性半乳糖血症  
(C)母親接受抗感染藥物治療 (D)嬰兒出生體重不足
4. 下列何者的體位已達臺灣成人肥胖之標準？  
(A)35 歲男性：身高178 公分、體重75 公斤、腰圍82 公分、臀圍95 公分  
(B)40 歲女性：身高156 公分、體重66 公斤、腰圍81 公分、臀圍93 公分  
(C)50 歲女性：身高152 公分、體重60 公斤、腰圍76 公分、臀圍90 公分  
(D)55 歲男性：身高166 公分、體重70 公斤、腰圍88 公分、臀圍100 公分
5. 某班級有 50 人，每學期會調查該班級學生視力狀況，結果顯示：民國101 年9 月有23 人近視，民國102 年2 月有26 人近視，民國102 年9 月有28 人近視，則101 學年該班級的近視發生率為多少%？  
(A)11.1 (B)18.5 (C)21.0 (D)52.0
6. 在食鹽中加碘以避免碘缺乏，屬於疾病預防措施的那一段？那一級？  
(A)第一段、第一級 (B)第一段、第二級  
(C)第二段、第三級 (D)第三段、第四級
7. 關於測量工具的評估，下列敘述何者錯誤？  
(A)重複測量可判斷問卷的信度  
(B)與黃金標準作比較可判斷問卷效度  
(C)就檢測方法而言，某種檢測方法檢測血液病毒特異性高表示真陰性率低  
(D)就檢測方法而言，某種檢測方法檢測血液病毒敏感度高表示真陽性率高

8. 有關自殺的敘述，下列何者錯誤？
- (A)與自殺有關的神經化學研究指出，血清素的活性降低會增高自殺風險
  - (B)個體從憂鬱發作的谷底走出時，反而是自殺的高危險期
  - (C)和企圖自殺者討論其自殺計畫，反而會增加其自殺風險
  - (D)南歐國家如希臘、義大利、西班牙基本上是自殺率較低的國家
9. 家庭暴力防治法中有關在家中受到暴力對待者聲請保護令的規定，下列何者正確？
- (A)未成年人、身心障礙者或因故難以委任代理人者，其法定代理人、三親等以內的血親或姻親、進行諮商的心理師，均可為其向法院聲請
  - (B)在被害人受家庭暴力之急迫危害者，只要聲請，不需到庭或以電話陳述，法院就應於四小時內以各種方式核發緊急保護令
  - (C)聲請緊急保護令時，應是基於考量被害人有遭受相對人虐待、威嚇、傷害或其他身體上、精神上不法侵害之現時危險
  - (D)通常保護令之有效期間為一個月，自接到保護令時開始生效，為提昇保護性，聲請延長得延長二次
10. 下列何者是自殺防治的一級預防？
- (A)對於自殺未遂者定期評估其自殺意念與企圖，以預防其再自殺
  - (B)對於有自殺計畫者，進行危機處理
  - (C)定期篩檢高自殺危險群，並給予輔導
  - (D)加強生命教育、壓力與情緒管理、心理衛生，促進國民心理健康
11. 有關老年人的自殺敘述，下列何者錯誤？
- (A)老年人使用的自殺方法的致命性與其他年齡層相似
  - (B)老年人自殺的危險因子與其他年齡層相似
  - (C)老年人較不會說出自殺意圖
  - (D)為降低自殺意念而給予藥物或轉介治療時，老年人的順從性高
12. 下列何者不是常用的病態性肥胖（morbid obesity）定義？
- (A)體重比理想體重大100磅
  - (B)體重為理想體重的2倍
  - (C)身體質量指數（body mass index）大於40 kg/m<sup>2</sup>
  - (D)身體體表面積（body surface area）大於2.0 m<sup>2</sup>

13. 有一婦女發覺右側乳頭出血，但沒摸到乳房腫塊，下列敘述何者正確？  
(A)乳癌的可能性達40%  
(B)最可能是侵襲性腺管乳癌（invasive ductal carcinoma）  
(C)最可能是良性乳管內乳突瘤（intraductal papilloma）  
(D)最可能是乳房發炎
14. 有關結核菌素試驗（P.P.D. test）的敘述，下列何者正確？  
(A)採用皮下注射  
(B)於注射後15~20分鐘判讀結果  
(C)注射部位為右臂三角肌  
(D)注入藥物劑量為0.1 c.c.
15. 陳女士52歲，身高160 cm、體重65 kg（BMI 25.4 kg/m<sup>2</sup>），腰圍82 cm、血清白蛋白2 gm/dL、身體脂肪量30%。有關陳女士的營養評估結果，下列何者正確？  
(A)過重、腰圍過粗，身體脂肪過多、蛋白質過少  
(B)正常、腰圍正常，身體脂肪正常、蛋白質正常  
(C)過重、腰圍正常，身體脂肪過多、蛋白質正常  
(D)肥胖、腰圍過粗，身體脂肪過多、蛋白質過少
16. 若病人為末期臨終且死亡為可預期，有關自然死（natural death）之敘述，下列何者正確？  
(A)尊重病人自主權終止無效維生醫療，為讓疾病自然發展的一個選擇  
(B)使用維生醫療延長瀕死期直到死亡  
(C)等同安樂死，加速病人死亡並減少痛苦  
(D)當治療不符合病人最大福祉，病人也無法自主決定停止此治療
17. 季麗絲（Gillies）的護理管理系統，下列敘述何者正確？  
(A)病人滿意度是過程  
(B)人員的招募與甄選是輸出  
(C)護理師的成長是輸入  
(D)績效考核是過程
18. 醫院突然接獲大量氣爆傷患，但由於該院從未遇見過如此嚴重的大災難，醫院風險管理部門於事後期望能建立該事件的危機管理機制，並進行事後分析，以利持續改善。下列何種工具較適用？  
(A)PDCA循環  
(B)根因分析  
(C)危害分析  
(D)異常事件通報分析

19. 有關反式脂肪的敘述，下列何者錯誤？  
(A)屬於不飽和脂肪酸 (B)反式脂肪酸可由油脂氫化加工產生  
(C)富含於棕櫚油中 (D)影響血膽固醇濃度
20. 張先生身高 172 公分，體重82 公斤，依照衛生福利部的標準，他的體型屬於下列何者？  
(A)正常 (B)過重 (C)輕度肥胖 (D)中度肥胖
21. 孕婦若在懷孕第三期時出現高血壓、蛋白尿、水腫且有抽搐的症狀，可能是患有：  
(A)妊娠糖尿病 (B)妊娠高血壓 (C)子癇症 (D)子癇前症
22. 一位1歲6個月大的孩子，於11個月大時因為得到川崎病（Kawasaki disease）接受高劑量靜脈注射免疫球蛋白治療。目前下列那一種疫苗不宜接種，以免影響此疫苗效果？  
(A)流感疫苗  
(B)日本腦炎疫苗  
(C)麻疹、腮腺炎、德國麻疹（MMR）三合一疫苗  
(D)白喉、百日咳、破傷風、b型嗜血桿菌、小兒麻痺五合一疫苗
23. 目前所知，阿茲海默症（Alzheimer disease）成因的危險因子與下列何者最為相關？  
(A)年齡老化（aging） (B)心血管危險因子，如高血壓（hypertension）  
(C)低教育程度（low education） (D)頭部外傷（head injury）
- 
24. 下列關於老人福利法的敘述，何者錯誤？  
(A)未領有生活津貼，且其失能程度經評估為重度以上，實際由家人照顧者，照顧者得申請發給特別照顧津貼  
(B)老人福利機構分為長期照顧機構、安養機構及其他老人福利機構  
(C)中低收入老人未接受收容安置者，得申請發給生活津貼  
(D)因精神障礙或其他心智缺陷，致不能為意思表示或受意思表示，或不能辨識其意思表示之效果之老人，法院得因主管機關之聲請，為監護或輔助之宣告
25. 老人福利法中，為了提高家庭照顧老人之意願及能力，提升老人在社區生活之自主性，政府應自行或結合民間資源提供之社區式服務，不包含下列那一項？  
(A)自立生活支持服務 (B)教育服務  
(C)退休準備服務 (D)餐飲服務

26. 身心障礙者權益保障法中，提供身心障礙者獲得所需之個人支持及照顧，促進其生活品質、社會參與及自立生活的服務，不包含下列那一項？
- (A)社區居住 (B)婚姻及生育輔導  
(C)課後照顧 (D)緊急救援服務
27. 下列何者不是我國長期照顧十年計畫的服務對象？
- (A)65歲老人  
(B)50歲的山地原住民  
(C)55歲的身心障礙者  
(D)僅IADLs（工具性日常生活活動功能）失能且獨居之老人
28. 下列關於身心障礙者個人照顧服務的敘述，何者錯誤？
- (A)友善服務提供到宅關懷，並支持身心障礙者社會參與  
(B)居家復健是由物理治療師、職能治療師或語言治療師對居家需繼續復健之身心障礙者，於其居住處提供復健治療服務  
(C)生活重建是指由身心障礙同儕，提供心理支持，以重新建構其獨立生活能力，協助其重建生活  
(D)社區居住是以一般社區住宅房舍提供身心障礙者非機構式之居住服務
29. 有關疾病篩檢的敘述，下列何者為誤？
- (A)敏感度為有病者之中，篩檢為陽性的比率  
(B)敏感度愈高，特異度也愈高  
(C)盛行率愈高，陽性預測值愈高  
(D)兩次篩檢結果可估計發生率
30. 臨床上常用來評估失智老人的臨床失智症評估量表（Clinical Dementia Rating Scale，簡稱CDR），不包括下列那一個評估項目？
- (A)抽象思考與語文理解能力 (B)判斷及解決問題能力  
(C)家居及嗜好 (D)個人自我照顧能力
31. 根據家庭暴力防治法第3條所定家庭成員，下列敘述何者錯誤？
- (A)配偶或前配偶  
(B)現有或曾有同居關係、家長家屬或家屬間關係者  
(C)現為或曾為直系血親或直系姻親  
(D)現為或曾為三親等以內之旁系血親或旁系姻親

32. 下列何者有變化為口腔癌之最高機率？  
(A)白斑 (leukoplakia) (B)紅斑 (erythroplakia)  
(C)扁平苔癬 (lichen planus) (D)口瘡性潰瘍 (aphthous ulcer)
33. 下列對於先天性免疫力 (Innate immunity) 的描述，何者正確？  
(A)需要多次抗原的刺激下才會啟動 (B)具有抗原的專一性  
(C)只發生在具有吞噬能力的細胞 (D)不具備長期的記憶性
34. 萊姆病 (Lyme disease) 的媒介物為何？  
(A)體蝨 (body louse) (B)體蜱 (body tick)  
(C)硬蜱 (hard-shelled tick) (D)軟蜱 (soft-shelled tick)
35. 下列何種病毒會透過胎盤，由母親傳染給胎兒，是導致嬰兒先天性缺陷，例如：小腦畸形等最常見的一種病毒？  
(A)腺病毒 (B)巨細胞病毒 (C)痘病毒 (D)D型肝炎病毒
36. 分析血液樣品中之酵素含量可以診斷多種疾病的進展，檢驗creatine kinase 可以用於診斷下列何種疾病？  
(A)cancer (B)heart attack (C)ricketts (D)hepatitis
- 
37. 下列有關恙蟲病 (scrub typhus) 之敘述，何者錯誤？  
(A)其致病原在自然界中以鼠類為主要儲菌宿主 (reservoir host)  
(B)臺閩地區之病媒蟎種主要為地里恙蟎 (*Leptotrombidium deliense*)  
(C)恙蟲病為一種廣泛世界性分布之人畜共通傳染病  
(D)人類感染而未能及時治療之死亡率約 1~60%
- 
38. 若已知國內男性抽菸盛行率為20%，隨機抽三位男性，三位都抽菸的機率為何？  
(A) 0.067 (B) 0.008 (C) 0.6 (D) 0.08
39. 衛生福利部食品藥物管理署推廣的「天天5 蔬果，健康又樂活」是屬於公共衛生預防原則的那一段那一級預防？  
(A)初段一級 (B)初段二級 (C)次段三級 (D)三段四級

40. 有關「校園飲品及點心販售範圍」規範，下列敘述何者錯誤？  
(A)適用於國小、國中，高中職不在規範中  
(B)飲品及點心食品一份供應量之熱量應在 250 大卡以下  
(C)飲品只有純果（蔬菜）汁、鮮乳、優酪乳、包裝飲用水  
(D)麵包中油及糖所提供熱量之總和不得超過總熱量之 40 %
41. 依據疾病管制署對於疑似狂犬病之動物咬傷傷口處理規定，暴露等級哪一類傷口需要接受免疫球蛋白治療  
(A)第二類 (B)第三類 (C)第四類 (D)第一類
42. 精障個案「三級對象」敘述何者為是？  
(A)二級對象追蹤第六個月以上  
(B)症狀描述總評 2 分之精神病患三級  
(C)需六個月訪視一次  
(D)以上皆是
43. 下列對於中老年慢性病的說法，何者最正確？  
(A)慢性病多為可逆性的病理變化  
(B)初期有明顯症狀  
(C)慢性病潛伏期長，不至於增加家庭或社會的負擔  
(D)中老年慢性病多屬於可預防，可藉由早期發現且儘早做控制
44. 下列何者為菸害防治法之規定？  
(A)高級中等學校以下學校除室外吸菸區外，不得吸菸，未設吸菸區者，全面禁止吸菸  
(B)對吸菸之青少年依其自主意願接受戒菸教育  
(C)大專校院之校外人士吸菸無約束之規定  
(D)103年4月1日起於禁菸區塊吸菸，將依「菸害防制法」第31條規定，最高可處新臺幣1萬元罰鍰
45. 下列哪一個年齡層不適合水痘疫苗？  
(A)小於 1 歲 (B)幼兒期 1-3 歲 (C)學齡期 7-12 歲 (D)青少年>12 歲
46. 依 PRECEDE 衛生教育模式診斷社區民眾的衛生教育需要，其步驟為何？  
①教育與組織診斷 ②行為和環境診斷 ③社會學診斷 ④流行病學診斷  
⑤行政與政策診斷  
(A)①⑤③②④ (B)③④②①⑤ (C)④③①⑤② (D)②①③④⑤

47. 有關重金屬污染之敘述，下列何者錯誤？
- (A) 鎘是污染土壤，而進入植物
  - (B) 鎘會造成骨骼組織病變
  - (C) 兒童對鉛的吸收量比成人為高
  - (D) 汞主要的毒性在危害肝臟，造成肝腫大
48. 學校蟯蟲檢查結果陽性學童，地段護理師家訪，最適當的衛教為？
- (A) 告知家長，家中棉被曝曬、床單以漂白劑殺菌清潔
  - (B) 依醫囑給藥服藥後並告知家長學童需在家自我管理最少 5 天以上
  - (C) 依醫囑給藥，並建議全家都要一起就醫治療才能根除
  - (D) 蟯蟲藏在直腸肛門口內，服藥一次即可殺死檢測呈陰性反應
49. 依據公務員廉政倫理規範，公務員出席演講、座談、研習及評審（選）等活動，支領鐘點費每小時不得超過新台幣多少元？另有支領稿費者，每千字不得超過新台幣多少元？
- (A) 三千元；一千元
  - (B) 三千元；二千元
  - (C) 五千元；一千元
  - (D) 五千元；二千元
50. 公務員遇有請託關說時，應於幾日內簽報其長官並知會政風機構？
- (A) 1 日
  - (B) 2 日
  - (C) 3 日
  - (D) 4 日